



rutnin - gimbel
lasikcentre

ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ
និងវិធីសាស្ត្រការព្យាបាល

WWW.RUTNINGIMBEL.COM

មជ្ឈមណ្ឌល LASIK វីត្តនីន គីមប៊ិល



មន្ទីរពេទ្យឯកទេសភ្នែកវីត្តនីន

ជាមជ្ឈមណ្ឌលជំនាញដែលផ្ដោតលើវិស័យចក្ខុរោគមុនដំបូងបំផុត នៅប្រទេសថៃ ។

ហើយប្រកបដោយបទពិសោធន៍ និងការផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកជំងឺជាង ៥០ ឆ្នាំ មន្ទីរពេទ្យវីត្តនីននៅតែរក្សាលំដាប់ទីមួយក្នុងការទទួលបានការជឿជាក់ទុកចិត្តពីអ្នកជំងឺ ។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩២ មក

ក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសរបស់យើងបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបឈាន មុខគេដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការវះកាត់ភ្នែកម្នីបគ្រប់ប្រភេទ ។

នៅមជ្ឈមណ្ឌល LASIK វីត្តនីន គីមប៊ិល ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញយើងខ្ញុំអាចផ្តល់ នូវមធ្យោបាយព្យាបាលភ្នែកម្នីបដោយការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកាំរស្មីទំនើបចុងក្រោយ បំផុត ដូចជា ReLEx SMILE ។

ការត្រួតពិនិត្យមុនពេលវះកាត់ និង តំណាក់កាលក្រោយការវះកាត់



ការត្រួតពិនិត្យមុនពេលវះកាត់

នៅអំឡុងពេលជួបពិគ្រោះលើកដំបូង ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់ដោយផ្ដោតទៅលើ ការសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើកម្រាស់ និង កំណោកកញ្ចក់ភ្នែក ការសិក្សាសរសៃឈាមភ្នែកដោយការដាក់ថ្នាំពង្រីក កូនក្រមុំភ្នែក ដែលគ្មានការឈឺចាប់ ។ បន្ទាប់មក ក្រុមគ្រូពេទ្យយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់អំពីស្ថានភាព ភ្នែករបស់លោកអ្នក ដើម្បីធ្វើការកំណត់បានថា ភ្នែករបស់លោកអ្នកអាចសាកសមគ្រប់លក្ខណៈ ក្នុងការធ្វើការបាញ់កាំរស្មីម៉្លប់ភ្នែក។ ដោយប្រកាន់យកនូវ គុណភាពនៃការមើលឃើញច្បាស់របស់លោក អ្នកជាអទិភាពការបាញ់ កាំរស្មីភ្នែកម៉្លប់នឹងត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីភ្នែករបស់លោកអ្នក មានលក្ខណៈ ឆ្លើយតបទៅនឹងការពិនិត្យល្អិតល្អន់របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យយើងតែប៉ុណ្ណោះ។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវការ ក្នុងការពិនិត្យ

- ត្រូវបញ្ឈប់ការពាក់លែនកញ្ចក់ទន់ (Soft Contact Lens) យ៉ាងហោច ៧ ថ្ងៃមុនការពិនិត្យ និង ៣ សប្តាហ៍ សំរាប់លែនកញ្ចក់រឹង (Hard Contact Lens)
- សូម្បែមមូលយកមកនូវថ្នាំលេប ឬ បន្លែកែត្នកទាំងអស់ដែលកំពុងប្រើ ឬ វេជ្ជបញ្ជារបស់ថ្នាំទាំងអស់ដែលធ្លាប់ប្រើ មកអោយគ្រូពេទ្យមើល
- ចាត់ចែងយានជំនិះត្រលប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីពិនិត្យរួច ដោយសារភ្នែកអាចមាន ការស្រវឹងមួយរយៈពេលក្រោយពិនិត្យរួច។






ការណាត់ជួបក្រោយការវះកាត់រួច

ក្រោយពេលវះកាត់រួច រហូតដល់ មួយឆ្នាំក្រោយ លោកអ្នកនឹងត្រូវបានតាមដានតាមការណាត់ជួបរបស់គូពេទ្យដែលមានដូចខាងក្រោម

- ការតាមដានជាចាំបាច់ ក្រោយវះកាត់ ថ្ងៃទី ១ និង ថ្ងៃទី ៧
- ការតាមដានបន្ថែម ក្រោយវះកាត់ខែទី១ ខែទី៣ ខែទី ៦ និង ១ ឆ្នាំ

ក្រុមគ្រូពេទ្យនៃ វីត្តនីន គីមប៊ិល មានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ និងការវះកាត់ ឡាស៊ែរ ។ ស្រមាប់ការពិនិត្យ ការវិនិច្ឆ័យមុនវះកាត់ និងការវះកាត់ មិនេត

ReLEx SMILE






ជាបច្ចេកវិទ្យាវះកាត់ចុងក្រោយ ដែលទំនើបនិងមានសុវត្ថិភាពបំផុត បច្ចេកវិទ្យាអាចអោយគ្រូពេទ្យ ប្រើប្រាស់ពន្លឺកាំរស្មីក្នុងពេលតែមួយដើម្បី បង្កើតស្រទាប់ស្តើងមួយក្នុងកញ្ចក់ភ្នែក កាត់កញ្ចក់ភ្នែកក្នុងទំហំតូច (២ ទៅ ៤ មីលីម៉ែត្រ) បន្ទាប់មកស្រទាប់ស្តើងនោះនឹងត្រូវបានយក ចេញតាមមុខកាត់ដែលបានបង្កើតនោះ រួចធ្វើអោយមានការប្រែប្រួលទំរង់របស់កញ្ចក់ភ្នែក និង ជាពិភាពម្លប់ភ្នែក។ ដោយសារការវះកាត់នេះមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ខ្លះទៅលើសិរីរាង្គ កញ្ចក់ភ្នែក ដូចនេះភាពឈឺចាប់ ក្នុងអំឡុងពេល និង ក្រោយការវះកាត់ គឺមានតិចតួចបំផុត។ គុណសម្បត្តិដ៏ធំនៃបច្ចេកទេសនេះ គឺ ការប្រើប្រាស់ពេលវះកាត់តិច ភាពឈឺចាប់តិចតួច និង មុខរបួសឆាប់សះ។

Femto LASIK


បច្ចេកទេសនេះ ត្រូវបានទទួលការពេញនិយមនិង
ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្រុមគ្រូពេទ្យទូទៅពិភពលោកដើម្បី
ព្យាបាលម្លប់ភ្នែកដោយទទួលបានលទ្ធផលគួរអោយកត់សម្គាល់។

ជាតំបូងគ្រូពេទ្យវះកាត់នឹងបង្កើតជាសន្ទះស្តើងមួយស្រទាប់នៅផ្ទៃខាងមុខនៃកញ្ចក់ភ្នែកជាមួយនឹង
ពន្លឺកាំស្មី។ បន្ទាប់មក បន្ទះនោះត្រូវបានសើយឡើង ដើម្បីប្រើប្រាស់ ពន្លឺកាំស្មីទីពីរចាញ់ទៅលើផ្ទៃ
ខាងក្នុងនៃកញ្ចក់ភ្នែក ដែលផ្តល់អោយនូវការមើលឃើញច្បាស់ក្រោយការវះកាត់។ ចុងបញ្ចប់
ស្រទាប់កញ្ចក់ខាងក្រៅនៃកញ្ចក់ភ្នែក នឹងត្រូវបិទគ្របនៅកន្លែងដើមវិញ
នោះការវះកាត់បានបញ្ចប់ជាស្ថាពរ។

ខុសប្លែកពីបច្ចេកទេស LASIK ពីមុន Femto LASIK គឺជាការវះកាត់ភ្នែកម្តងដែល ផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើ
ពន្លឺកាំស្មី។ វាបានផ្តល់ការវះកាត់ដែលមានភាពរលូន
មានផលពិបាកក្រោយការវះកាត់តិចតួចជាងមុន ជាពិ
សេសគឺការឆាប់មើលឃើញច្បាស់ក្រោយពេលវះកាត់។



វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ





LASIK
(Laser-assisted in situ Keratomileusis)

ជាបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ថ្មីនៃការកែតម្រូវកែវិញដោយកាំរស្មីដោយផ្ទៃក្រៅលើការគ្របឡើងវិញនៃស្រទាប់របស់កញ្ចក់ភ្នែក។ ស្រទាប់គ្របឡើងវិញនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយឧបករណ៍ពិសេសដែលចង្អុលបណ្តិត បក្រសទាប់ខាងលើចេញ រួចហើយធ្វើការចិត្រសទាប់ខាងក្នុងរបស់កញ្ចក់ភ្នែកដោយកាំរស្មី excimer laser។ ចុងបញ្ចប់ ស្រទាប់ខាងលើនេះត្រូវបានយកមកគ្របនៅកន្លែងដើមវិញ ដែលជំរុញឱ្យមុខរបួសមានការជាសះស្បើយជាងមុន។

PRK (Photorefractive Keratectomy)

ជាបច្ចេកវិទ្យាកែតម្រូវស្រទាប់កញ្ចក់ភ្នែកដំបូងបង្អស់ ហើយត្រូវបានគេយកមកប្រើចំពោះការកែសម្រួលកញ្ចក់ភ្នែក រឺ អាក្សីម៉ាត កំរិតទាប។ ដំបូង, ចង្អុលបណ្តិតនឹង ចិត្រស្រទាប់ស្មើផ្ទៃផ្ទៃខាងលើកញ្ចក់ភ្នែកចេញ, បន្ទាប់មក គាត់ធ្វើការចិត្រស្រទាប់ខាងក្នុងរបស់កញ្ចក់ភ្នែកដោយ excimer laser ដើម្បីកែតម្រូវកញ្ចក់ភ្នែក។ ស្រទាប់ខាងលើដែលចិត្រចេញនេះ នឹងបាត់បង់មុនឡើងវិញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។



បេក្ខភាពអ្នកជំងឺដែលអាចធ្វើការវះកាត់បាន

ក្រុមគ្រូពេទ្យភ្នែកតែងអនុវត្តទៅតាមក្រមសីលធម៌នៃមន្ទីរពេទ្យរតនីន ដែលបង្កើតដោយ វេជ្ជបណ្ឌិត ឧទ្ទិយ រីត្តនីន ។ ចំពោះបេក្ខភាពដែលអាចទទួលការព្យាបាលវះកាត់នេះបាន លុះត្រាតែសមស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសដែលបានកំណត់ទុកជាមុន។

លក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសទាំងនេះ ត្រូវបានពិនិត្យដោយក្រុមអ្នកជំនាញរបស់យើង។ ចំពោះបេក្ខជនដែលទទួលការព្យាបាលវះកាត់ ចាំបាច់ត្រូវមានសុខភាពទូទៅល្អ និង ត្រូវមានគំហើញដែលមិនមានការប្រែប្រួល។

ក្រៅអំពីបញ្ហាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ចក្ខុបណ្ឌិតរបស់យើងក៏ ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ ទៅលើពេលវេលា ក្នុងការពិភាក្សាជាមួយរាល់អ្នកជំងឺដែលចូលមកពិគ្រោះ ដូចជា ការផ្តល់កំលាំងចិត្ត, ការរំពឹងទុកក្រោយការវះកាត់ និងការយល់ឱ្យច្បាស់ អំពីបច្ចេកទេសនៃការវះកាត់។

ក្រោយពីបានពិនិត្យ និង ពិភាក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ អ្នកជំងឺដែលសមស្របសំរាប់ការវះកាត់ នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនសំរាប់ទទួលការវះកាត់កែគំហើញដោយការស្និ ។



លក្ខខណ្ឌមូលដ្ឋាន

- អាយុ ៖ មិនតិចជាង ២០ ឆ្នាំ
- មានសុខភាពល្អ
- ស្ថានភាពភ្នែកល្អ
(មិនមានជំងឺភ្នែក, មិនមានភ្នែកស្ងួត)
- មិនមានផ្ទៃពោះ,
មិនមានការបំបៅដោះកូន ។

ទំនាក់ទំនង

ក្រុមអ្នកជំនាញរបស់យើង នឹងអាចផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ និងអាចកំណត់ថ្ងៃណាត់ជួបសំរាប់ ពិគ្រោះជាមួយចក្ខុបណ្ឌិតរបស់យើង ក៏ដូចជាការពិនិត្យភ្នែកមុនពេលវះកាត់ផងដែរ ។ ប្រសិនបើត្រូវណាត់ត្រូវពេទ្យជំនាញណាមួយដែលលោកអ្នកស្គាល់សូមមេត្តាបញ្ជាក់ឈ្មោះត្រូវពេទ្យឱ្យបានច្បាស់ផងពេលធ្វើការណាត់ ។

ម៉ោងធ្វើការដូចខាងក្រោមនេះ ៖

ថ្ងៃច័ន្ទ - សៅរ៍	08.00 - 18.00
ថ្ងៃអាទិត្យ	08.00 - 17.30
ថ្ងៃឈប់សម្រាក	08.00 - 16.00



មជ្ឈមណ្ឌល LASIK វីត្តនីន គីមបិល

អគារ Q House Asoke 66 ជាន់ទី 16 វិថីសុខុមវិត ផ្លូវលេខ 21 (អៈស៊ីក) ,
ខ្ពង់ទើយនឿ, ខណ្ឌវឌ្ឍនា, ទីក្រុង បាងកក 10110, ប្រទេសថៃ



+66 (0)2 056 3355 / +66 (0)6 1415 3555



info@rutningimbel.com



www.rutningimbel.com

